

moc1/moc2 小鼠口腔鳞状细胞癌/雌性

基本信息

细胞名称	moc1/moc2 小鼠口腔鳞状细胞癌
细胞品系	C57BL/6 Cxcr3-/-
细胞来源	国外
细胞鉴定	STR 鉴定已通过
细胞形态	淋巴母多角形细胞样,贴壁+悬浮生长
培养基	DMEM(含 NaHCO ₃ 1.5g/L)(BasMed-AW-013)+FBS 10% + P/S1%500ML 完全培养基：IMDM:F10/F12=2:1313ml:157ml 培养基 +FBS10%(50ml) +2.5mg/500ml 胰岛素 +20ug/500ml 氢化可的松 +2.5ug/500ml EGF+ P/S 1% 双抗, 1%。
培养条件	气相：空气，95%；二氧化碳，5%。 温度：37 摄氏度，培养箱湿度为 70%-80%
细胞背景	口腔鳞状细胞癌(OSCC)是头颈癌的一个突出子集，头颈癌是全球第六大常见癌症。发生 OSCC 的主要危险因素是致癌物暴露，将头颈癌的这一亚群与人瘤病毒诱导的头颈癌区分开来。尽管在检测、手术、化疗和放疗方面取得了进展，但 OSCC 的预后几十年来一直保持稳定。此外，在诊断时，大约三分之二的 OSCC 患者患有局部晚期疾病，导致发病率和死亡率增加。
细胞用途	仅供科研使用

细胞事项

注意事项	<p>1. MOC1 细胞活性特别高, 增值速度非常快, 不建议传代密度太大, 而选择稀一点重铺, 等长满 80%左右传代的时候, 很难消化下来, 建议加入 0.25%EDTA 的胰酶进去后充分混匀所有细胞都接触到胰酶, 放置到培养箱进行消化, 时长大约是 3-4 分钟左右后拿出来</p>
	<p>2. 在培养器皿的侧边进行拍打帮助细胞脱落, 拍打过程大约持续 2 分钟左右才会脱落大部分细胞, 如果脱落比例还不是很多, 也可以重新放回培养箱继续消化 1-2 分钟后再次拿出来进行拍打脱落, 等 80-90%细胞都脱落后再终止消化, 离心重悬再重新铺瓶, 分散均匀。</p>
	<p>3. MOC2 细胞贴壁性和常规细胞类似没有特别牢固。倍增周期也没有 MOC1 快。采用常规消化方法处理。</p>
常温发货	<p>收到后 T25 瓶消毒再放置培养箱静置 2-3 小时后观察密度和状态拍照 2-3 张反馈给销售, 密度达标就可以传代。前期传代比例 1:2, 等再次长满后传代时建议冻存其中一整瓶成 1 个 1ml 冻存管, 另外一瓶继续传代, 反复冻存 2-3 只后才扩增做实验, 以防突发情况引起断种。</p>
干冰发货	<p>常规细胞发货冻存管 2 只, 复苏 1 只, 另外一只备用, 第一个复苏不成功时严格按照厂家要求复苏第二个, 均没有复苏成功的情况即时留存复苏照片通知我们。</p>
贴壁细胞	<p>1. 弃去培养上清, 用不含钙、镁离子的 PBS 润洗细胞 1-2 次。</p>
	<p>2. 加入 0.25%(w / v) 胰蛋白酶-0.53 mM EDTA 于培养瓶中(T25 瓶 1-2mL, T75 瓶 2-3mL), 置于 37°C培养箱中消化 1-2 分钟(难消化的细胞可以适当延长消化时间),</p>

	<p>然后在显微镜下观察细胞消化情况, 若细胞大部分变圆并脱落, 迅速拿回操作台, 轻敲几下培养瓶后加入 3-4ml 含 10%FBS 的培养基来终止消化。</p> <p>3. 轻轻打匀后吸出, 在 1000RPM 条件下离心 3-5min, 弃去上清液, 补加 1-2mL 培养液后吹匀。将细胞悬液按 1: 2 的比例分到新 T25 瓶/6cm 培养皿中, 添加 6-8ml 按照说明书要求配置的新的完全培养基以保持细胞的生长活力, 后续传代根据实际情况按 1:2~1:5 的比例进行。</p> <p>4. 细胞冻存: 收到细胞后建议在培养前 3 代时冻存一批细胞种子以备后续实验使用。</p> <p>5. 运输用的培养基(灌液培养基)不能再用来培养细胞, 请换用按照说明书细胞培养条件新配制的完全培养基来培养细胞。</p>
悬浮细胞	<p>悬浮状态下生长的细胞, 可以通过向培养瓶中添加完全培养基来维持细胞的生长状态, 一般情况下细胞密度维持在 $1 \times 10^5 \sim 1 \times 10^6$ 个/mL(不同细胞对密度要求不同) 可以维持细胞的正常生长。如需分瓶可以将细胞悬液收集到离心管中 1000rpm, 离心 5min, 弃去上清, 补加 1-2mL 培养液后重悬混匀后将细胞悬液按 1: 2 的比例分到新 T25 瓶中, 添加 6-8ml 按照说明书要求配置的新的完全培养基以保持细胞的生长活力, 后续传代根据实际情况按 1:2~1:4 的比例进行。</p>
生物安全	<p>1. 所有动物细胞均视为有潜在的生物危害性, 必须在二级生物安全台内操作, 并注意防护, 所有废液及接触过此细胞的器皿需要灭菌后方能丢弃。</p> <p>2. 建议在复苏冻存细胞时始终使用防护手套、衣服和戴上防护面罩。注意: 冻存管浸没在液氮中会泄漏, 并会慢慢充满液氮。解冻时, 液氮转化成气相可能导致容器爆炸或用危险力吹掉其盖子, 从而产生飞扬的碎屑造成人员伤害。</p>